



Secaar

Agir ensemble pour un développement intégral

Diffusé par **SECAAR**
01 BP 3011 LOMÉ 01 TOGO
00228 22 20 28 20
secretariat@secaar.org
www.secaar.org



L'ÉLEVAGE DES CHEVRES

Sources : « La voix du paysan », n°77 et n° 80.
Documents Secaar.



ALIMENTATION

Il est facile de trouver la nourriture de la chèvre. En tant que ruminant, elle sait très bien tirer profit d'un fourrage, même s'il est de mauvaise qualité. Elle réussit à brouter là où les vaches n'auraient pas eu assez d'herbe. Mais attention la chèvre est aussi délicate : elle n'apprécie pas le fourrage moisi ou entrain de pourrir mais aime recevoir une nourriture variée et pas trop humide.


Une chèvre de 30 kg par exemple a besoin de 1.5 à 2 kg de fourrage frais par jour si les herbes sont jeunes, ou de 3.5 à 5 kg si ce sont des herbes jeunes (les jeunes herbes fraîches ont près de 80% d'eau, alors que les vieilles n'en ont que 50 % environ). En enclos il est possible de distribuer des herbes, des feuilles, de la paille, du foin... mais aussi des résidus de cuisine, des résidus de récolte...

En complément de l'alimentation de base par les fourrages, il est conseillé de distribuer chaque jour :

- Une poignée de tourteau de coton ou d'arachide par chèvre,
- de la poudre d'os brûlé ou des sels minéraux.

Il est également nécessaire de disposer dans l'enclos, un bloc de sel de cuisine à lécher librement par les animaux.

Si les chèvres sont élevées en enclos (ce qui permet une alimentation plus régulière des animaux et un suivi facilité de son élevage par l'éleveur), il sera nécessaire de couper l'herbe en saison des pluies et de la conserver pour nourrir les chèvres en saison sèche. Il faut sécher l'herbe jusqu'à ce qu'elle perde une quantité de son eau de façon à pouvoir éviter le pourrissement. Il est préférable de couper l'herbe lorsqu'elle n'a pas encore fleuri. Lorsqu'il pleut beaucoup, il est nécessaire de laisser sécher en accrochant sur des tripieds en bois au-dessus du sol. Le modèle à 4 pieds (à gauche) permet un séchage plus rapide car l'aération se fait plus facilement.



L'eau : la chèvre consomme en moyenne 4 fois plus d'eau que de matière sèche. Elle a donc besoin de beaucoup d'eau, surtout en saison sèche. Il est très important de toujours laisser à la disposition des animaux (surtout des chèvres productrices de lait) de l'eau propre dans un seau.

LE LOGEMENT

Faire un abri pour protéger ses animaux :

- Du soleil,
- du vent,
- de la pluie,
- de la boue sur les sabots.

Pour l'abri et l'enclos de repos, il faut prévoir une surface de 1.5 à 2 m² par chèvre, (voir fiche technique : « L'élevage du mouton »).

SANTE

Une chèvre en bonne santé doit avoir de l'énergie, être alerte, entreprenante, a le regard clair et vif. Elle doit avoir de l'appétit et bien ruminer après les repas. Elle ne doit pas être maigre. Le poil doit être lisse et luisant. Les muqueuses des yeux, de la bouche doivent être de couleur rosé. Les crottes doivent être nombreuses, rondes et fermes. Il est indispensable de bien surveiller ses animaux : regarder chaque jour s'ils sont en bonne santé (être très attentif aux premiers signes de diarrhées et à la toux).

Pour garder vos chèvres en bonne santé :

- Alimenter bien vos animaux, tous les jours à heures fixes : une alimentation insuffisante ou inadéquate affaiblit les bêtes,
- éviter les enclos sales, toujours humides et avec de forts courants d'air (infections pulmonaires, développement de bactéries infectieuses et de parasites),

- éviter de faire brouter très souvent les bêtes sur les mêmes pâturages pour ne pas contaminer continuellement le pâturage. En faisant des rotations de pâturages on rompt le cycle des parasites contenus dans les déjections et autres excréments,
- traiter avant la maladie,
- contre les vers intestinaux et pulmonaires : donner à chaque animal 2 fois par an (au début et à la fin des pluies) soit un carré de Benzal soit 1/6 de comprimé de Panacur 750,
- contre les tiques et les puces : traitez avec «la poudre à grenier» ou du Crésyl ou du pétrole,
- contre la peste et le charbon : si ces maladies contagieuses existent dans la région il faut vacciner.

LES PARASITES EXTERNES

PARASITES	QU'EST-CE QU'ON VOIT ?	COMMENT TRAITER
Puces et tiques	Les bêtes se frottent partout. Cela peut être : <ul style="list-style-type: none">• des puces : elles sautent et sucent le sang ,• des tiques : elles sont fixées sur la peau, dans les oreilles, entre les pattes, entre les sabots.	Frotter les bêtes avec de la «poudre à grenier» (Actellic, Kothrine). On peut laver les bêtes (à midi) avec du Crésyl dans de l'eau (1 mesure de Crésyl pour 20 mesures d'eau). Faire sécher au soleil. Surtout ne pas arracher la tique car elle va casser : la tête reste et va faire une plaie qui risque de s'infecter.
Gale	Les poils tombent. Il y a des croûtes sur les oreilles, près des cornes, sur le nez et les pattes. C'est la gale : un insecte parasite qui donne des plaies.	On frotte les croûtes avec un mélange d'huile d'arachide et de Crésyl (1 % de Crésyl). Ou bien, on peut frotter les croûtes avec un mélange d'huile de vidange et de pétrole (1 mesure de chaque). Refaire ces traitements 3 fois (intervalle d'une semaine entre chaque traitement). On peut aussi utiliser du Tigel ou de l'Ascabiol.

LES PARASITES INTERNES

PARASITES	QU'EST-CE QU'ON VOIT ?	COMMENT TRAITER
Vers intestinaux	L'animal a la diarrhée : la queue, l'arrière train, les pattes sont sales. Il peut y avoir des vers intestinaux. Ils sont fins ou gros. Ces vers profitent de la nourriture mangée par les chèvres. Certains vers sucent le sang.	Faire un traitement au Benzal : 1 carré de Benzal pour une chèvre de 25kg. Si on n'a pas de Benzal on peut traiter avec du Panacur 750 : 1 comprimé pour 6 chèvres.
Ténia	Le ténia peut donner des diarrhées ou des constipations. Le ténia est un vers intestinal gros et long. On voit dans les crottes des anneaux, comme des grains de riz. Le ténia attaque et tue surtout le jeune mouton, moins la chèvre.	Même traitement que contre les vers intestinaux.
Douve du foie	Il peut y avoir des douves dans le foie. Parfois, le cou gonfle sous la mâchoire. Quand la bête est morte, on voit des trous dans le foie. On voit dans les canaux du foie des vers mous, blancs et plats.	Même traitement que pour les vers intestinaux. Mais attention : le Panacur ne traite pas la douve. Si on n'a pas de Benzal, on peut prendre du Fasinex (1 comprimé pour 4 chèvres).
Strongles pulmonaires	La bête mange moins. Elle tousse. Le nez est sale et coule. Elle peut avoir de la fièvre (41-42°). Ce sont des vers dans les poumons, la trachée, les bronches.	Donner soit 1 carré de Benzal / chèvre, soit du Panacur 750, soit du Bollumisole (1 comprimé / 6 chèvres).
Oestres	La bête éternue. Cela peut être des oestres (vers dans le nez).	Donner du Ranide (1 comprimé / 8 chèvres). Attention : Ranide peut provoquer des avortements.
Coccidiose	De fortes diarrhées (avec du sang chez les adultes). La coccidiose est un parasite intestinal, comme les amibes. Il donne la diarrhée.	Donner pendant 2 jours, matin et soir, 1 comprimé de Nivaquine dans de l'eau. Il faut aussi faire boire beaucoup les animaux malades

MALADIES QUI VIENNENT DE LA NOURRITURE

PARASITES	QU'EST-CE QU'ON VOIT ?	COMMENT SOIGNER ?
Météorisation	Le côté gauche est gonflé. L'animal respire mal et meurt. La chèvre a trop mangé de mil, de drèches, de farine, de tourteau. Cela fermente dans la panse. L'animal gonfle, ne respire plus et meurt. On peut manger la viande car elle n'est pas empoisonnée.	On peut donner très vite du charbon pilé dans un peu d'eau. On peut percer le côté gauche avec un couteau pointu. On met dans la plaie un petit tuyau pendant 12 heures (Bic sans le réservoir à encre). L'air fermenté sort par le trou. La plaie guérit toute seule.
Changement rapide de nourriture	L'animal a des troubles nerveux et de la diarrhée. Il peut mourir en quelques heures.	Ne jamais changer d'un seul coup la nourriture.

MALADIES CONTAGIEUSES

PARASITES	QU'EST-CE QU'ON VOIT ?	COMMENT SOIGNER ?
Peste	Il y a des tâches rouges partout dans la bouche, sur la langue. Elles évoluent en plaies. L'oeil est rouge avec des larmes, puis du pus. Toux sèche, respiration rapide, diarrhée, perte d'appétit et forte fièvre (41-42°). Cela peut être la peste. C'est une maladie contagieuse. Elle passe aux autres animaux et tue très vite.	Il faut isoler les animaux malades. On peut leur injecter des antibiotiques (bipénicilline). Pour empêcher la maladie il faut vacciner avec Bovipestovax ou Thermovax.
Charbon	L'animal malade a une forte fièvre, du sang, noir et sombre, coule du nez et de l'anus, l'urine est rouge. La bête peut mourir en quelques heures. C'est une maladie très grave ; le Charbon.	Isoler les animaux malades. Traiter toutes les bêtes à la pénicilline très forte. La maladie peut attaquer et tuer les hommes. Il ne faut jamais manger la viande d'une bête morte, il ne faut pas y toucher avec des mains blessées. Il faut vacciner avant la maladie avec Anthravax. Quand un animal est mort, il faut brûler le cadavre. Si on enterre le cadavre, la maladie reste dans le sol. Elle va remonter en surface et donner la maladie à vos animaux même après 10 ans.